

### Structure des tiques



Tête (rostre) : permet de se nourrir et de se fixer solidement tout en injectant parfois des bactéries ou virus  
 Une femelle tique (*Ixodes ricinus*) adulte peut atteindre une longueur de 4 mm. Si la tique est gorgée de sang, elle peut même avoir 7 à 8 mm de longueur.

### Saison des tiques



Printemps (mars à juin) jusqu'à l'automne (octobre)  
 Quand la température est supérieure à 7°C

### Lieux des tiques



Printemps (mars à juin) jusqu'à l'automne (octobre)  
 Quand la température est supérieure à 7°C

### Zones du corps appréciées des tiques



Zones chaudes, humides et où la peau est fine sur le corps : pli des genoux, intérieur de la cuisse, aine, nombril, creux des aisselles, cou, nuque, derrière les oreilles.


### Transmission d'agents infectieux



La FSME ou méningite à tique : virus de l'encéphalite à tiques  
**Période d'incubation** : 2 à 28 jours




La borréliose ou maladie de Lyme : bactérie *Borrelia burgdorferi*  
**Période d'incubation** : plusieurs jours à plusieurs semaines



**Les tiques sont des arachnides qui peuvent piquer l'homme et provoquer parfois de graves maladies**

### Symptômes



Pas de trace



Pas de douleur




Parfois coloration rouge au point de la piqûre

### Bons conseils & Prévention



Utilisez des produits répulsifs efficaces contre les tiques



Vérifiez, après une sortie en forêt la présence de tique sur votre peau



Évitez de toucher les plantes proches du sol



Portez des vêtements de couleur claire



Rentrez les chemises et pulls dans le pantalon

Copyright Creapharma 2019 Sources: www.creap



**Piqûres de tiques.ch**

### Traitements

#### En prévention



FSME : vaccin

#### Après une piqûre



Enlever la tique



Désinfecter la piqûre



Observer l'évolution



En cas d'augmentation de la taille de la piqûre ou de fièvre consultez un médecin.

harma.ch/tiques.htm
PN-TIQU-F-V-1-0